

## Växtskyddsmedel till bekämpning av växtsjukdomar i produktion av prydnadsväxter 2016, i växthus och på friland

uppdaterade 28.12.2015

Mer information om brukskoncentration, begränsningar i användningen osv i bruksanvisningen. Minor use ("off label") bruksanvisningar [www.tukes.fi](http://www.tukes.fi) Kasvinsuojelurekisteri

Läs bruksanvisningen före användning, för att försäkra dig om rätt användning, ändamål och brukskoncentration.

verksam substans grupp*	Verksam substans	Preparat	gråmögél	mjöldagg	rost	bomullsmögél	bladmögél	Pythium	Phytophthora	Fusarium	Rhizoctonia	Övriga sjukdomar	Användning	Karenstider för nytto-organismer (källor: Berner Kasvinsuojeluopas 2013, <a href="http://www.koppert.nl">www.koppert.nl</a> och <a href="http://www.biobest.be">www.biobest.be</a> )	Resistens risk**	Representant
<b>Endast i växthus</b>																
11	kresoxim-metyl	<b>Candit</b>		X	X							<i>Diplocarpon rosae</i> -ros svartfläcksjuka	besprutning, förebyggande, inte på grundvattenområden	Lindrigt skadlig för <i>Amblyseius swirskii</i> -rokvälstrets vuxna och Mycotal svamppreparatet (karenstid 1 vk), för övriga nytto-organismer ofarligt till den del information finns.	hög	BASF Crop Protection
3	imazalil	<b>Fungazil 100 SL - minor use</b>	x	X								<i>Diplocarpon rosae</i> -ros svartfläcksjuka	växthus: besprutning, förebyggande och delvis kurativ	Lindrigt skadlig för swirskii- och spinnrokvälster. Skadlig för Trianum-, Mycotal- och PreFeRal-svamppreparat. Oskadlig för övriga nytto-organismer.	medel	Berner
	rypsolja	<b>Carbon Kick Booster</b>		X									besprutning, förebyggande och kurativ, även i hemträdgårdar	Delvis skadlig för nytto-organismer, ingen karenstid. Rokvälstrens förökning hindras då äggen inte kläcks. Speciellt rokvälster och parasitsteklar bör sättas ut på nytt efter behandling.	-	Carbon Kick
<b>I växthus- och frilandsodling</b>																
11	azoxystrobin	<b>Amistar (5 l), Ortiva (1 l) - minor use</b>		X	x	x	X	x	X		x	bladfläcksjukdomar: <i>Alternaria</i> sp., <i>Collectotrichum</i> sp., <i>Cercospora</i> sp., <i>Mycosphaerella</i> , <i>Cladosporium</i> , <i>Myrothecium</i> och <i>Septoria</i> blommögél: <i>Collectotrichum</i>	besprutning eller bevattning, förebyggande	Lindrigt skadlig för mjöllus-parasitstekel och Mycotal. Ofarligt för övriga nytto-organismer.	hög	Syngenta Crop Protection
33	fosetyl-Al	<b>Aliette 80 WG</b>					X	X	X				blanda i växtunderlaget, bevattning eller besprutning, förebyggande, inte på grundvattenområden	Som besprutning relativt skadlig för bladlus- och <i>Feltiella</i> -gallmyggans larver, <i>A. swirskii</i> -rokvälster, skadligt för Mycotal och PreFeral, karenstid 1 vecka. Ofarligt för övriga.	låg	Berner
9	mepanipyrim	<b>Frupica SC - minor use</b>	X	X								<i>Colletotrichum</i>	besprutning, förebyggande	Lindrigt skadlig för spinnrokvälster och Trianum-svamppreparat.	medel	Berner
28	propamokarb-hydroklorid och fosetyl-Al	<b>Previcur Energy - minor use</b>					X	X	X				bevattning eller besprutning, förebyggande	Lindrigt skadlig för <i>A.swirskii</i> och <i>Hypoaspis -rokvälster</i> . Ofarligt för nytto-organismer till den del det finns information att tillgå, ex. trips-, <i>Californicus</i> - och spinnrokvälster samt mjöllus-parasitstekel.	låg/medel	Berner
2	iprodion	<b>Rovral 75 WG</b>	X			X					X	<i>Alternaria</i> , svampsjukdomar i lökblomster	besprutning, förebyggande	Lindrigt skadlig för <i>A.swirskii</i> -rokvälster. Ofarligt för övriga nytto-organismer. Skadligt för PreFeRal (karenstid 2 veckor).	låg/hög	BASF Crop Protection
9 och 12	cyprodinil och fludioxinil	<b>Switch 62.5 WG</b>	X			X					x	<i>Colletotrichum</i>	besprutning, förebyggande och kurativ, inte på grundvattenområden	Lindrigt skadlig för spinnrokvälster, <i>Orius</i> och Trianum, Mycotal och PreFeRal.	medel och medel/låg	Syngenta Crop Protection

17	fenhexamid	Teldor	X						besprutning, förebyggande	Oskadlig för parasitsteklar, lindrigt skadlig för spinnrovkvalster och <i>Hypoaspis</i> -rovkvalster, <i>Orius</i> -rovstinkfly och nyckelpigor. Relativt skadlig för Mycotal (karenstid 1-2 veckor).	låg/medel	Berner	
3	propikonazol	Tilt 250 EC - minor use	X	X					Blommögel och bladfläcksjuka såom <i>Diplocarpon rosae</i> , <i>Alternaria</i> spp., <i>Colletotrichum</i> sp., <i>Cercospora</i> sp., <i>Mycosphaerella</i> , <i>Cladosporium</i> , <i>Myrothecium</i> , <i>Ramularia</i> och <i>Septoria</i>	besprutning, förebyggande och kurativ	Lindrigt skadlig för <i>Orius</i> -rovstinkfly och guldögonslända. Skadligt för svamppreparaten Trianum-, Mycotal- och PreFeRal. Skadligt för <i>Feltiella</i> och bladlusgallmygga. Ofarlig för övriga nyttoorganismer.	medel	Berner
3	penkonazol	Topas 100 EC	X	X					besprutning, förebyggande och kurativ, inte på grundvattenområden	Skadligt för Preferal- och Mycotal svamppreparaten (karenstid 1 vecka). Icke skadlig för övriga nyttoorganismer.	medel	Syngenta Cropprotection	
7 och 11	boskalid och pyraklostrobin	Signum - minor use	X		X			X	<i>Alternaria</i> , bladfläcksjukdomar	besprutning	Relativt skadlig för <i>Macrolophus</i> , lindrigt skadlig för bladlusparasitsteklar, ofarligt för rovkvalster	medium och hög	BASF Crop Protection
	<i>Streptomyces griseoviridis</i>	Mycostop			X		X		<i>Alternaria</i>	bevattning eller besprutning, förebyggande	Icke skadlig för nyttoorganismer.	nej	Verdera
	<i>Gliocladium catenulatum</i>	Prestop	X		X	X	X	X		besprutning, bevattning eller blanda i växtunderlaget, förebyggande	Icke skadlig för nyttoorganismer.	nej	Verdera
	<i>Gliocladium catenulatum</i>	Prestop Mix	X		X	X	X	X		bevattning eller blanda i växtunderlaget, förebyggande	Icke skadlig för nyttoorganismer.	nej	Verdera
<b>Endast på friland</b>													
M3	mankozeb	Dithane NT	X	X	X	X	X	X	bladfläcksjukdomar	besprutning, förebyggande	Mycket skadlig för <i>A.swirskii</i> -rovkvalster, bladlusgallmyggans larver och Mycotal-svamppreparatet. Lindrigt skadlig för guldögonslända.	nej	Berner

**Observera! Minor use för prydnadsväxter - ansökan inlämnad av Handelsträdgårdsförbundet - kontrollera att produkten är godkänd före användning**

1	tiofanat-metyl	Don-Q minor use (tidigare - Topsin till 31.12.2015)	X	X		X	X	X	X	<i>Cylindrocladium</i> , <i>Ramularia</i> , <i>Thielaviopsis</i> och övriga svampsjukdomar, har effekt på mer än 40 olika släkten.	bevattning - förebyggande och kurativ	Lindrigt skadlig för <i>Trichogramma</i> - parasitstekeln; lindrigt/relativt skadlig för <i>A. degenerans</i> -, trips- och spinnrovkvalster (karenstid 2-3 veckor). Relativt skadlig för PreFeRal-svamppreparatet.	hög	Berner
---	----------------	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---------------------------------------	---	-----	--------

\* indelning i grupper av aktiva substanser enligt FRAC. FRAC: Fungicide Resistance Action Committee, som gör upp råd för att förebygga resistens i användningen av fungicider.

\*\* klassificering enligt FRAC